privet Poultry Booster 850 g | 850 g



Hersteller	priVet Farming®
Artikelnummer	4500
Gewicht	1kg
Länge	99mm
Breite	99mm
Höhe	222mm

Produktbeschreibung

Ergänzungsfuttermittel (Pulver) für Geflügel

Zur Aufwertung von Geflügelfutter in jedem Lebensalter

privet Poultry Booster ist für ein gesundes Wachstum mit einer intensiven Versorgung der Knochen mit natürlichen Mineralien aus dem HuminoMin®-Komplex konzipiert. **privet Poultry Booster** kann durch eine verbesserte Stoffwechselrate die Futteraufnahme optimieren, was zu einem rascheren Wachstum und einer dementsprechenden Gewichtszunahme führen kann. Gleichzeitig werden Gelenkskondition und Knochenbau unterstützt, sowie Schalenfestigkeit und Legeleistung von Legehennen können verbessert werden. Ebenfalls kann die Fleischqualität und Gewichtsentwicklung von Masttieren durch eine natürliche Versorgung mit Mineralstoffen und Spurenelementen erhöht werden.

Zusammensetzung: Leinkuchen, Bierhefe, Algenkalk, Sonnenblumenkuchen, Moor, Gras-, Kräuter-, Leguminosenpflanzen, Seealgenmehl, Traubenkernmehl, Bierhefezellwände (MOS), Apfeltrester, Pastinak (gemahlen), Aroniatrester, Schwarzer Johannisbeertrester, Eierschalenpulver, Möhrentrester, Sellerieknollen (gemahlen), Moringablätter (gemahlen)

Zusatzstoffe/kg: Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568) 0,6 g, Bentonit (1m558i) 0,2 g.
Die Gesamtmenge an Klinoptilolith sedimentären Ursprungs aus allen Quellen darf den Höchstgehalt von 10000 mg/kg nicht überschreiten. Die Gesamtmenge an Bentonit darf den in Alleinfuttermitteln zulässigen Höchstgehalt von 20000 mg/kg Alleinfuttermittel nicht übersteigen.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 35,2%, Rohfett 7,4%, Rohfaser 6,8%, Rohasche 7,8%, Kalzium 0,82%, Phosphor 0,98%, Natrium 0,14%, Methionin 0,62%, Lysin 1,51%

Fütterungsempfehlung: Je nach Wachstumsbedarf und Futterqualität bis zu 20-40% der gesamten Tagesration dem Futter beifügen. Bei Bedarf, wie z. Bsp. in Stresssituation (Mauser und Transport), kann die Fütterungsmenge verdoppelt werden. 1 TL entspricht ca. 3 g. 1 EL entspricht ca. 9 g.

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Die gleichzeitige Verabreichung von Robenidin ist zu vermeiden. Die gleichzeitige Verabreichung von Kokzidiostatika außer Robenidin ist kontraindiziert bei einer Bentonit-Menge ab 5000 mg/kg Alleinfuttermittel.